

Erläuterungen, Maßnahmen und Hinweise

Flächen (Möbel, Wandflächen und Fußböden) in Zimmern MRE-positiver Klienten sollen problemlos und schnell einer Wischdesinfektion oder einer desinfizierenden Aufbereitung unterzogen werden können. Polstermöbel sollten einen abnehmbaren und für ein desinfizierendes Waschverfahren geeigneten Bezug aufweisen.

Hinsichtlich der **Flächendesinfektionsmittel**, -Konzentrationen und –Einwirkzeiten ist auch bei den verschiedenen MRE prinzipiell keine Änderung notwendig. Das gilt prinzipiell auch für die Indikationen (speziell für die Desinfektion nach einer Kontamination durch Biostoffe). Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es im Zusammenhang mit MRGN und der Anwendung von QAV-Lösungen in Verbindung mit Wipes zu Infektionsübertragungen gekommen ist¹. Daher wäre unter Einbezug von Fachleuten anlassbezogen zu hinterfragen, ob das Wipe-System und ob die Wirksubstanz beibehalten oder gewechselt werden soll.

Ferner wäre kritisch zu hinterfragen:

- ob die Reinigungs- und Desinfektionspläne aktuell, vollständig und korrekt sind.
- ob die im Reinigungs- und Desinfektionsplan genannten Indikationen eingehalten werden (können).
- Bei Verwendung von Wipes oder Tissues: Ob die Tücher in Verbindung mit dem angewandten Mittel wirklich geeignet sind, ob die Standzeiten der Mittel eingehalten werden (können) und ob die Wipe-Behältnisse gemäß den Angaben des Herstellers aufbereitet werden (können).
- ob bei den Desinfektionsmaßnahmen Einmalhandschuhe getragen und vor Verlassen des Raumes ausgezogen werden.

Wenn das Zimmer eines MRE-positiven Klienten frei wird oder wenn die MRE-Kolonisation bzw. –Infektion nicht mehr vorhanden ist, soll das Zimmer mittels einer **Schlussdesinfektion** aufbereitet werden:

- Die zu berücksichtigenden Flächen entsprechen denen der Grundreinigung; statt eines Reinigungsmittels wird jedoch ein Flächendesinfektionsmittel entsprechend den Angaben des Reinigungs- und Desinfektionsplanes verwendet.
- Die verwendeten Utensilien sind zu entsorgen bzw. der Aufbereitung zuzuleiten.
- Die Bezüge von Polstermöbeln werden abgezogen und die Gardinen abgehängt. Beides wird einer desinfizierenden Aufbereitung zugeleitet.

Begründung

Die Flächendesinfektion trägt zur Unterbindung von indirekten Kontaktübertragungen bei. Die problemlose und korrekte Durchführung muss im Zimmer MRE-positiver Klienten gewährleistet sein.

¹ Verbund für Angewandte Hygiene e.V. „Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortränksystem für die Flächendesinfektion“ / 2012 / http://brennpunkt-hygiene.de/wp-content/uploads/2014/07/VAH_Stellungnahme_zu_Tuchspendersystemen.pdf